

Qualitätszahlen Chirurgie 2016

Verschluss eines Leistenbruchs		
Kriterium	Todesfälle/Patientenzahl	Kennwert und Ergebnis in Prozent
Sterblichkeit beim Verschluss einer Leistenhernie	0 299	< 1,7 0%
Weitere Kennwerte		
Entfernung der Gallenblase		
Kriterium	Todesfälle/Patientenzahl	Kennwert und Ergebnis in Prozent
Sterblichkeit bei Entfernung der Gallenblase	0 171	< 0,48 0%
Weitere Kennwerte		
Anteil Laparoskopischer Operationen bei Entfernung der Gallenblase		> 92,1 98,80%
Anteil Wechsel auf offene Operation während eines laparoskopischen Eingriffs		< 4,1 0,60%
Entfernung Dickdarm oder Enddarm bei Krebs (C18/19/20 + 5-455,-456,-458,-484,-485)		
Kriterium	Todesfälle/Patientenzahl	Kennwert und Ergebnis in Prozent
Sterblichkeit bei der Entfernung von Dickdarm oder Enddarm bei Krebs	1 27	< 7,7 4%
Weitere Kennwerte		
Anteil Laparoskopischer Operationen bei Entfernung von Dickdarm oder Enddarm bei Krebs		keine Kennwertvorgabe 100%
Anteil von Nahtschwächen (Anastomoseninsuffizient, T88.8)		< 5,2 0%
Entfernung Dickdarm bei entzündeter Ausstülpung der Darmschleimhaut (K57+5-454,-455,-456)		
Kriterium	Todesfälle/Patientenzahl	Kennwert und Ergebnis in Prozent
Sterblichkeit bei Entfernung entzündlicher Ausstülpungen der Darmschleimhaut	0 37	Keine Kennwertvorgabe 0
Weitere Kennwerte		
Anteil Laparoskopischer Operationen bei Entfernung entzündlicher Ausstülpungen der Darmschleimhaut	36 37	Keine Kennwertvorgabe, je größer, desto besser 8,10%
Anteil von Nahtschwächen (Anastomoseninsuffizient, T88.8)	1 37	Keine Kennwertvorgabe, je geringer, desto besser 2,70%